

## **VACCINATION ROUGEOLE**

### **Comment déterminer son niveau de protection contre la rougeole?**

#### **1. Date de naissance ?**

- avant 1964 : protection considérée comme acquise, le virus de la rougeole circulant partout et donc infectant pratiquement tout le monde jusque dans les années soixante. Aucune mesure particulière.
- dès 1964 : protection considérée comme absente – sauf après 2 doses de vaccin contre la rougeole. Immunité à vérifier !
- Ne PAS se fier à la notion d'une rougeole qui aurait été attrapée dans l'enfance étant donné le risque d'erreur élevé !
- Mieux vaut une vaccination en trop (effets secondaires nuls si anticorps préexistants) qu'une protection insuffisante !

#### **2. Retrouver son carnet de vaccination !**

- Si carnet introuvable ou inexistant, considérer que la vaccination n'a pas eu lieu et prévoir 2 doses de vaccin :
  - dès que possible (1ère dose)
  - dans un mois (2e dose)
- Si carnet retrouvé, procéder à son déchiffrage...

#### **3. Décryptage de son carnet de vaccination !**

- Rechercher les vaccins suivants :
  - Attenuvax (rougeole)
  - Biviraten (rougeole – oreillons)
  - Eolarix (rougeole – rubéole)
  - MMR-II (rougeole – oreillons – rubéole)
  - MMVax (rougeole – oreillons)
  - Moraten (rougeole)
  - MoRuviraten (rougeole – rubéole)
  - Pluserix (rougeole – oreillons – rubéole)
  - Priorix (rougeole – oreillons – rubéole)
  - Rimevax (rougeole)
  - Rimparix (rougeole – oreillons)
  - Triviraten (rougeole – rubéole) (inefficace contre les oreillons)
- Compter les doses reçues !
- Faire compléter les doses manquantes, jusqu'à un total de deux doses à un intervalle de 4 semaines.